



**DIAGNOSTYKA**  
laboratoria medyczne  
...więcej niż wynik

## Małe owady... DUŻE RYZYKO!

### Wakacyjny problem

Lato - długo oczekiwany czas relaksu na łonie natury. Niestety często beztruskę letniego wypoczynku zakłócają nam mniej lub bardziej dokuczliwe ukąszenia różnych owadów. Skutki ukąszeń szczególnie niebezpieczne są dla osób reagujących alergicznie na ich jad.

Wczesne rozpoznanie alergii, dzięki prostym badaniom, pozwoli na podjęcie odpowiednich środków bezpieczeństwa, wyposażenie się w zestaw pierwszej pomocy i uzyskanie szybkiej pomocy lekarskiej.

### Reakcje alergiczne na jad owadów

Mniej więcej u co 5. osoby po użądleniu przez owady błonkoskrzydłe (osy, pszczoły, szerszenie) występują reakcje alergiczne. Jad owada należy do takich alergenów, po których reakcja alergiczna występuje w ciągu zaledwie kilku minut po użądleniu. Reakcje te dzielą się na miejscowe (obrzęk, rumień, świąd) oraz uogólnione.

Reakcje uogólnione są bardziej niebezpieczne i mogą mieć różne nasilenie: od pokrzywki, przez objawy ze strony układu pokarmowego, zamroczenie, duszności, obrzęki stawów, aż po tzw. szok (wstrząs anafilaktyczny), cechujący się przede wszystkim gwałtownym spadkiem ciśnienia krwi, utratą przytomności, a w krytycznych przypadkach mogący doprowadzić nawet do zgonu.



## Jak zmniejszyć ryzyko?

Stwierdzenie uczulenia poprzez badanie krwi jest łatwe, bezpieczne i bezbolesne. Badania polegają na określeniu poziomu swoistych przeciwciał IgE.

Badania wykonywane są **bez skierowania lekarza, nie wymagają spełnienia specjalnych warunków** (np. nie ma potrzeby przychodzenia na czczo) i **trwają tyle, co zwykłe pobranie krwi**. Wynik dostępny jest już następnego dnia.

**W przypadku stwierdzenia alergii na jad owadów należy pamiętać przede wszystkim o profilaktyce i przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa, tak aby uniknąć użądlenia.** Osoby, u których badania wykazały uczulenie mogą wyposażać się w zestaw pierwszej pomocy, o który należy zapytać lekarza, a który może uratować życie.

Lekarz alergolog może również zlecić leczenie mające na celu odczulenie. Przed podjęciem tej decyzji konieczne jest precyzyjne określenie, który z jądów powoduje reakcję alergiczną.

Zapytaj w Punktach Pobrań DIAGNOSTYKI o **testy alergiczne!**

Chcesz się dowiedzieć więcej?  
Skontaktuj się z najbliższym Oddziałem DIAGNOSTYKI.  
Pełną listę naszych placówek znajdziesz na:

[www.diag.pl](http://www.diag.pl)

*Uwaga:*

*Informacje zawarte w niniejszej ulotce mają wyłącznie charakter poglądowy oraz edukacyjny i nie mogą stanowić podstawy do podejmowania decyzji dotyczących podjęcia lub niepodjęcia leczenia lub innych procedur medycznych. Interpretacji wyników badań powinien dokonywać lekarz.*



[www.diag.pl](http://www.diag.pl)